



# キク編



病害虫注意報  
2019年4月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 白さび病、害虫の発生に注意しましょう！

暖かくなり、暖房機の稼働時間が減ったタイミングで白さび病が発生すると防除が困難になります。発病させない環境づくりと薬剤散布をしっかりと行ってください。換気口から害虫が飛び込み、暖かい部屋の中で大発生！ということもあります。初期発生を見逃さないと同時にハウス回りの雑草は病害虫発生源となるので、雑草が大きくなる前に除草剤等を散布しましょう。

## 今月のおすすめローテーション



※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますためご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。

初 生 期 育	アブラムシ類, フラーパラゾウムシ アザミウマ類, ハダニ類	トクチオン乳剤	1,000倍 発生初期/5回
	アブラムシ類, アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤 ※	アブラムシ類 4,000倍, アザミウマ類 2,000倍 発生初期/5回
	灰色かび病、炭疽病、 べと病、さび病	エムダイファー水和剤	400~650倍 発病初期/8回



破 蕾 期	ハダニ類	カネマイト フロアブル	1,000~1,500倍 -/1回
	アザミウマ類, ハモグリバエ類, オオタバコガ	スピノエース 顆粒水和剤	5,000倍 オオタバコガは 2,500~5,000倍 発生初期/2回
	白さび病, ※ 黒斑病, 灰色かび病 ハダニ類, うどんこ病	ポリオキシシン AL水溶剤	2,500倍 発病・発生初期/8回

消 灯 時	アブラムシ類, アザミウマ類	inochio セイレーン フロアブル	2,000倍 発生初期/3回
	白さび病	inochio オペラフラワー乳剤	2,000倍 発病初期/3回

※ 花き類・観葉植物登録



発 蕾 期	白さび病, アブラムシ類, アザミウマ類, ハモグリバエ類	ハチハチ乳剤	1,000倍 発病・発生初期/4回
	ハダニ類	スターマイトフロアブル	2,000倍 発生初期/1回



新規登録薬剤のご紹介!  
特徴を知って効果的に使用しよう!

## inochio セイレーンフロアブル

アブラムシ類, アザミウマ類  
2,000倍 発生初期/3回

スピロテトラマト水和剤 22.4%



**新規の作用性** ; キクの登録農薬で新系統殺虫剤

優れた**浸透移行性** ; 有効成分が植物体内に取り込まれ導管と師管を通して生長点付近へ!

長い**残効性** ; **遅行性**ながら**幼虫**にじわじわ効きます。残効性に優れ、効果が長く持続します。

成虫には効果が低いため、発生前に予防的に使用することをお勧めします。成虫が発生している場合は、他剤と混用してください。