



キク編



病害虫注意報
2019年8月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

高温期です！立枯れ症状、ハスモンヨトウ、オオタバコガにご注意ください！

高温期はハダニ類、アザミウマ類も多発しやすいので定期的な薬剤防除を行いましょう。
立枯れ対策には定植前の粒剤、もしくは薬剤の灌注を行いましょう。

| 登録内容 | 薬剤名 | 希釈倍率・使用量 | 処理方法 |
|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 立枯病 | リゾレックス粉剤 | 50kg/10a | 土壌混和(定植前/1回) |
| 立枯病など | リゾレックス水和剤 | 500~1000倍 3L/m ² | 土壌灌注(生育期/5回) |
| 立枯病 (リゾクト菌) | ユニフォーム粒剤 (リゾミル成分+アミスター成分) | 18kg/10a | 土壌表面散布 (定植時または生育期/3回) |
| 発根促進 | タチガレン液剤 | 1,000倍 5~10L/m ² | 土壌灌注(挿し芽直後/1回) |

合計5回
以内の
使用

今月のおすすめローテーション

地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますためご注意ください。展着剤、葉面散布剤などを加用する場合もご注意ください。

| 生育初期 | オオタバコガ、ハスモンヨトウ※ | プレオフロアブル | 1,000倍 発生初期/4回 |
|------|------------------|-------------------|--|
| | ハダニ類※ | テデオン乳剤 | 500~1,000倍 発生初期/10回 |
| 破蕾期 | アザミウマ類 アブラムシ類 | トランスフォーム フロアブル | 2,000倍 (アザミウマ類 1,000~ 2000倍) 発生初期/3回 |
| | アザミウマ類 ハダニ類 | アグリメック※ | 500倍 発生初期/5回 |
| 消灯時 | アザミウマ類 ハダニ類 | アファーム 乳剤 | 1000倍 (アザミウマ類 1000~2000倍) 発生初期/5回 |
| | アザミウマ類 ハダニ類 | ペンタック 水和剤※ | 1,000倍 -/回 |

白さび病の出やすい圃場にはinochioオペラフラワー乳剤を散布することをおすすめします！

| 発蕾期 | アザミウマ類 アブラムシ類 ハダニ類 | inochio セイレーンフロアブル | 2,000倍 発生初期/3回 |
|-----|------------------------------|-----------------------|--|
| | ハダニ類、アザミウマ類 オオタバコガ、アザミウマ類 | ディアナSC※ | 2,500~5,000倍 (アザミウマ類 2,500倍) 発生初期/2回 |

※…花き類・観葉植物登録

プロテックa

カルシウム、パラフィン配合
植物表皮を保護強化

萎れ防止に！

500~1,000倍
葉面散布



カテキンパワー

茶葉から抽出した植物活力資材
高温による穂や苗の腐りや
草勢維持におすすめ！

1,000倍
葉面散布もしくは
どぶ漬け時に



ハダニ類 適用拡大！

inochio
セイレーンフロアブル

2019.7.10

ハダニ類、アザミウマ類、アブラムシ類
2,000倍 100~300L/10a
発生初期/3回

