



キク編



病害虫注意報 2019年10月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

各種病害虫の発生に注意！

今月は各種病害虫 (ダニ・アザミウマ・チョウ目類・アブラムシ・白さび病)の最適な温度・湿度環境になり、多発が予想されます。特定の病害虫に偏らない防除が必要です。

薬剤散布は予防的に行いましょう！

今月のおすすめローテーション



※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますためご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|--|-----|------|------------------|--------------------|
| 生育初期 | アブラムシ類、コナジラミ類、ミカンイロアザミウマ | ベストガード水溶剤 | 1,000倍 (アブラムシ類 1,000~2,000倍) 発生初期/4回 | 破蕾期 | アザミウマ類 | ファインセーブフロアブル | 2,000倍 発生初期/2回 | 消灯時 | ハダニ | マイトコーネフロアブル | 1,000倍 開花前まで/1回 |
| | さび病、炭疽病、灰色かび病、べと病 | エムダイファー水和剤 | 400~650倍 発病初期/8回 | | 白さび病 うどんこ病 アブラムシ類 | ピリカット乳剤 | 白さび病、アブラムシ類：1,000倍 うどんこ病：2,000倍 発病・発生初期/6回 | | 白さび病 | inochioオペラフラワー乳剤 | 2,000倍 発病初期/3回 |
| 発蕾期 | アブラムシ類、アザミウマ類、ハダニ類 | inochioセイレーフロアブル | 2,000倍 発生初期/3回 | ※…花き類・観葉植物登録 | | | | | | | |
| | 白さび病、うどんこ病※、黒斑病※、灰色かび病※、アザミウマ類※、ハダニ類※ | ポリオキシシAL水溶剤 | 2,500倍 発生・発病初期/8回 | | | | | | | | |

秋雨対策資材



ファイトマジック

光合成能力の向上、
葉の色出しに！
吸収力の高いキレートマグネシウムと
微量元素配合

葉面散布
500~1,000倍



プロテックa

カルシウム、パラフィン配合
植物表皮を保護強化

農薬との混用可
葉面散布
500~1,000倍