



キク編

病害虫注意報 2021年6月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

白さび病・害虫注意！

5月に引き続き、白さび病の発生しやすい季節です。

循環扇、モヤコン等を活用して空気の対流と湿度を下げる環境づくりを徹底していきましょう！

また気温の上昇に伴いアザミウマ類、ハダニ類の害虫の発生も増加します。

悪天候が続く時期ですので、晴れの日に薬剤散布ができるよう天気予報に注意しながらしっかり予防を行いましょう！

今月のおすすめローテーション



地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますためご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。

時期	対象病害虫	薬剤名	使用量・倍率	使用時期	回数
定植時	白さび病	inochio キクツチャ粒剤	6~9kg/10a (作条土壌混和)	定植時	1回
生育初期	白さび病	ジマンダイセンフロアブル	500~800倍	-	8回
	アザミウマ類・アブラムシ類 ハダニ類	inochio セイレーンフロアブル	2,000倍	発生初期	3回
消灯時	白さび病	ラリー乳剤	3,000倍	発病初期	5回
	アザミウマ類・ハダニ類 オオタバコガ・ハスモンヨトウ	グレースシア乳剤	2,000倍	発病初期	2回
発蕾時	うどんこ病・白さび病 アブラムシ類	ピリカット乳剤	2,000倍 (白さび病・アブラムシ類1,000倍)	発病初期	6回
	アブラムシ類・アザミウマ類	トランスフォームフロアブル	1,000~2,000倍 (アブラムシ類2,000倍)	発生初期	3回
破蕾時	白さび病	inochio オペラフラワー乳剤	2,000倍	発病初期	3回
	ハダニ類	カネマイトフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	1,000~1,500倍	-	1回

光合成能力UP!

ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

クレートマグネシウム+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

★日照不良時の代謝の向上!



肥料登録
生第87201号

非選択性茎葉処理移行型

KARETER
農林水産省登録第24938号
農耕地登録品

雑草の根まで枯らす!

うすめて使える除草剤

雑草退治 カレター[®] 除草剤

本剤使用回数: 3回/樹木など

対象雑草	使用時期	10a当たり	
		薬量	希釈水量
一年生雑草	雑草生育期	500ml	通常散布100L
多年生雑草	生育盛期	1,000ml	少量散布 25L
スギナ	生育盛期	2,000ml	少量散布25~50L



※キク・花卉類登録ございません。
圃場周りの除草作業にご利用ください。